

2004年4月8日

# みつばち通信

2004年-1号

みつばち薬局待鳳店

京都市北区紫竹西南町 66

494-1788 FAX494-1566

みつばち薬局紫野店

京都市北区紫野上築山町 2-2

417-3911 FAX417-3910



## 桜も満開！ 笑顔も満開！

4月3日 今宮公園でお花見会

在宅療養中の患者さん 18 名と家族の方たちが満開の桜を楽しみました。昨年、一昨年と開花時期を外れましたが、今年はバッチリ満開の桜を堪能。みつばち薬局待鳳店常勤職員全員が、ボランティアの方や待鳳診療所の職員の方たちと一緒に参加し、津田薬局長が挨拶しました。お一人一人の自己紹介後お茶を飲んだり、合唱したり、待鳳診療所歯科職員のハンドベル演奏「春の小川」を楽しんだり、短時間でしたが久しぶりの外出で春を満喫しました。

(事務長：原)



# 安全・安心の調剤業務

薬局内ではこんな業務をしています。

写真は待鳳店

## トリプルチェックで正確調剤を追及



**処方箋入力**  
処方箋の記載内容をコンピューターに指示します。錠剤の一部は自動的に調剤されます。同種薬の重複や、相互作用のある薬がチェックされます。



**散剤調剤** 散剤（粉薬）の調剤には監査システムを使うことで更に正確に行っています。



**監査** 調剤された薬が、処方箋通り正確に作られているか、処方された薬が患者さんの服用履歴から問題がないか、薬同士や健康食品との相互作用、食べ物との相互作用が無いかなど、確認します。また、負担金の計算などの確認もします。

**疑義照会** 処方箋の内容が、前回と違ったり、薬学的に疑問がある場合は、安全確認のため、処方医に電話で確認します。



### お薬の説明と会計

できあがったお薬を患者さんと共に確認し、お渡しします。薬の効果や服用（使用）方法、服用中の注意などの説明、そして、薬学的視点から体調や療養についてのお話をお聞きします。

「絶対安全な薬」はありません。万一、副作用が発現する場合、第一発見者は患者さんご本人ですので、副作用などについてもご説明します。お薬のこと、療養上のことは勿論、何でもご相談下さい。



**全自動分包機**（左）コンピュータに入れたデータに基づき、何種類もの飲み方の薬が自動的に「朝」「昼」「夜」などまとめて包装されます。




**水剤調剤** 水薬の調剤も監査システムを使って慎重に行っています。飲むときに「わかりやすく」なるように目盛りを記入したりしています。

毎月約2千人の方に利用頂いているみつばち薬局は待鳳店40、紫野店60の医療機関の処方箋を応需し、1200種類を超える医薬品を取り扱っています。正確・迅速・分かりやすくを目標に頑張ります。



待鳳店 一月十八日  
 紫野店 一月十一日  
**もちつき大会**



1月11日に紫野会館で北健康を守る会主催で、1月18日には待鳳診療所前で待鳳学区もちつき大会実行委員会主催で、それぞれ行われました。杵が臼に勢い良く打ち下ろされると気持ちよい音が立ち、見物人からはかけ声もかけられていました。「突き手」や「返し手」とともに「丸め手」も奮闘しました。待鳳ではボランティアの方たちが手分けして約300人のお年寄りのお宅に2個ずつお餅を配りました。

## みつばち薬局 知得クイズ

これウソ？ホント？

下の5問に「ウソ(間違っている)」「ホント(真実)」でお答え下さい。  
 問題が正しいと思う場合は、間違いだと思う場合は×を解答欄に記入して、応募箱にお入れ下さい。

全問正解の方の中から、抽選で10名様に図書券(1,000円)を差し上げます。  
 当選者の発表は、薬局内に掲示します。

締め切り日：5月15日(土)

薬局内の「クイズ応募箱」に入れてください。

- 問1：お薬を飲み忘れたとき、二回分を一度に飲んでもよい
- 問2：お薬をお茶やジュース、牛乳、アルカリイオン水などで飲んでもよい
- 問3：むやみに錠剤を砕いたり、カプセルをあけて飲んではいけない
- 問4：点眼するときには一度にたくさんの薬液を目に入れる方が効果がある
- 問5：心臓の貼り薬は心臓の上に必ず貼らなくてはいけない

ご住所：

お名前：

電話番号：

問題	問1	問2	問3	問4	問5
解答欄					

## 【回答】

ウソ

1日3回お薬を飲む場合、飲み忘れに気づいた時には決められた時刻からそれほど時間がたっていなければ、すぐに1回分を服用します。次の服用は4時間ぐらいに後にします。次の服用時間が近ければ、飲み忘れた分は1回抜き、次からきちんと飲みましょう。特別な薬（抗菌薬、糖尿病薬など）はあらかじめ対処法を確認しておきましょう。

ウソ

薄めのお茶はあまり問題有りませんが「濃いお茶」「ジュース」「牛乳」「アルカリイオン水」は薬の吸収に影響し、効果に影響を及ぼすことがありますので、さけた方が無難です。

ホント

薬の形体にはそれぞれ意味があります。特別な指示のない限り自分勝手に錠剤を砕いたりカプセルをあけて飲んだり、飲みにくいからといって飲むのを中止したりすることはやめましょう。

ウソ

目の中におさまる点眼液は、1回に1滴で十分です。それ以上の液はあふれ出てしまうため、目に対する薬の効果は増強しません。

ウソ

心臓に作用して狭心症の発作を予防するのが目的。貼る場所は心臓の上にこだわらず腹部、腰、二の腕などやわらかい皮膚の部分であればどこでもかまいません。